



Pflanzenbau Aktuell Nr. 14/2019 Herbizidnachbehandlung Wintergetreide

In eher dünn stehenden Wintergetreidebeständen finden Sie relativ häufig eine breite Palette an typischen Arten der **Spätverunkrautung**. Neben den typischen Arten wie **Ackerwinde** und **-distel** ist regional auch **Klettenlabkraut** und **Windenknöterich** von Bedeutung.

Möglichkeiten zur Problemunkräuterbekämpfung in Wintergetreide

| | HerbizidAuswahl | Aufwand- menge (l bzw. kg/ha) | Anwendungs- zeitraum (BBCH) | zugelassen in | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|------------------|
| | | | | Winterweichweizen | Wintergerste | Winterroggen | Wintertriticale | Dinkel | Winterhartweizen |
| Problemunkräuter | | | | | | | | | |
| Acker-Kratzdistel | Ariane C | 1,5 | 13-39 | X | X | X | X | X | - |
| | Omnera LQM | 1,0 | 21-39 | X | X | X | X | - | - |
| | Pointer Plus | 0,05 | 12-39 | X | X | X | X | - | - |
| | Pointer SX | 0,0375 | 30-37 | X | X | X | X | - | - |
| Acker-Lichtnelke | Pointer Plus | 0,05 | 12-39 | X | X | X | X | - | - |
| Acker-Schachtelhalm | U 46 M-Fluid | 1,5 | 13-39 | X | X | X | X | X | X |
| Acker-Winde | Biathlon 4D + Dash | 0,07 + 1,0 | 13-39 | X | X | X | X | X | X |
| | Ariane C | 1,5 | 13-39 | X | X | X | X | X | - |
| Ausfallleguminosen | Biathlon 4D + Dash | 0,07 + 1,0 | 13-39 | X | X | X | X | X | X |
| | Pointer SX | 0,045 | 13-37 | X | X | X | X | - | - |
| Erdrauch | Pixxaro EC | 0,5 | 13-45 | X | X | - | - | - | X |
| Hundskerbel | Pointer Plus | 0,05 | 12-39 | X | X | X | X | - | - |
| Hundspetersilie/ Wilde Möhre | Ariane C | 1,5 | 13-39 | X | X | X | X | X | - |
| | Pointer Plus | 0,05 | 12-39 | X | X | X | X | - | - |
| Kartoffeldurchwuchs | Ariane C | 1,5 | 13-39 | X | X | X | X | X | - |
| Klettenlabkraut | Starane XL/ Pyrat XL | 1,5 | 30-45 | X | X | X | X | - | - |
| | Tomigan 200 | 0,9 | 30-45 | X | X | X | X | - | - |
| Kornblume | Ariane C | 1,5 | 13-39 | X | X | X | X | X | - |
| | Omnera LQM | 1,0 | 21-39 | X | X | X | X | - | - |
| | Starane XL | 1,5 | 30-45 | X | X | X | X | - | - |
| Phacelia | Ariane C | 1,5 | 13-39 | X | X | X | X | X | - |
| | Omnera LQM | 1,0 | 21-39 | X | X | X | X | - | - |
| Wicke (Arten) | Biathlon 4D + Dash | 0,07 + 1,0 | 13-39 | X | X | X | X | X | X |