



## Pflanzenbau Aktuell Nr. 18/2020 – 30.04.2020

### Herbizideinsatz in Kartoffeln

Durch die Niederschläge der nächsten Tage werden die Dämme angefeuchtet und Unkräuter und -gräser erhalten optimale Auflaufbedingungen. Aber auch die Voraussetzungen für bestmögliche Wirkungsgrade der Bodenherbizide sind gegeben. Bereits aufgelaufene Unkräuter werden durch die Zugabe von **0,3-0,4 + 0,75-1,0 l/ha Quickdown + Toil** sicher erfasst.

#### Übersicht: Mögliche Produktkombinationen zum Voraufbau-Herbizideinsatz in Kartoffeln

Herbizid-kombinationen	Aufwandmenge (l bzw. kg/ha)	Wirkung auf												
		Ackerfuchsschwanz	Flughäfer	Hühnerhirse	Amarant	Ausfallraps/ Ackersenf	Bingelkraut	Franzosenkraut	Gänsefuß, Melde	Kamille	Klettenlabkraut	Schwarzer Nachtschatten	Windknöterich	Knöterich-Arten
<b>Metribuzin-frei</b>														
<b>Bandur + Proman</b>	2,5 + 2,0	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	x(x)	xx	xx(x)
<b>Boxer + Proman</b>	3,0 + 2,0	x(x)	x(x)	xx	xx	xx(x)	x(x)	xxx	xx(x)	xx	xx(x)	xx(x)	xx	xx
<b>Centium 36 CS + Proman</b>	0,25 + 2,0-2,5	(x)	-	xx(x)	xx(x)	xx	x	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	xx	xx	xxx
<b>Novitron DamTec + Proman</b>	2,0 + 2,0	x(x)	x(x)	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	xx	xxx
<b>Metribuzin-haltig</b>														
<b>Arcade<sup>1)</sup></b>	4,0-5,0	xx(x)	x	xx	x(x)	xxx	x	xxx	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx	xx	xx
<b>Artist + Centium 36 CS</b>	2,0 + 0,25	xxx	-	xxx	x(x)	xxx	xx(x)	xx(x)	xxx	xx(x)	xxx	xx	xx	xx(x)
<b>Bandur + Artist</b>	2,0 + 2,0	xxx	x(x)	xx(x)	xx	xxx	xx	xx(x)	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	xx	xx
<b>Bandur + Sencor Liquid</b>	3,0 + 0,4-0,6	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	xx	xxx
<b>Boxer + Sencor Liquid</b>	4,0 + 0,4	xx	x(x)	xx	x(x)	xx(x)	x(x)	xxx	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx	xx
<b>Novitron DamTec + Sencor Liquid</b>	2,0 + 0,4	xx(x)	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	x(x)	xx
<b>Proman + Metric</b>	2,0 + 2,0	xx	-	xxx	xx(x)	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x(x)	xx	xx(x)

<sup>1)</sup> Drainaufflage NG405 beachten!

**Hinweis:** 0,2-0,4 l/ha Herbosol unterstützen die Haftung des Bodenherbizids an den Bodenteilchen. Eine Verlagerung in tiefere Bodenschichten auf lockeren Dämmen oder durch starke Niederschläge wird somit verringert.

Die **Bekämpfung von Ungräsern** erfolgt im 3- bis 4-Blatt-Stadium der Gräser (NA Kultur). Es empfehlen sich beispielsweise 1,0 l/ha Fusilade Max (Quecke 2,0 l/ha), 1,5 + 1,5 l/ha Focus Aktiv Pack (Quecke 2,5 + 2,5 l/ha), 0,75 + 1,0 l/ha Select 240 EC + Radimix (Quecke 1,0 + 1,0 l/ha) oder 1,0 l/ha Zetrola.