



## Pflanzenbau Aktuell Nr. 26/2020 – 08.07.2020 Zwischenfruchtanbau

Die Vegetation schreitet mit großen Schritten voran. Um nach der Getreideernte umgehend mit der Zwischenfruchtaussaat beginnen zu können, möchten wir Sie schon heute über unser Zwischenfruchtsortiment informieren.

Die **Mischungsauswahl** sollte auf die betriebliche **Fruchtfolge** abgestimmt werden:

- Kreuz- und Korbblütler (z. B. Sonnenblumen) in Rapsfruchtfolgen meiden.
- Vermeiden Sie Buchweizen in Fruchtfolgen mit Zuckerrüben, Kartoffeln oder Leguminosen.
- Nur nematodenresistente Kreuzblütler dienen in Zuckerrüben zur Nematoden-Reduktion.
- Senf und Phacelia begünstigen Eisenfleckigkeit in Kartoffeln.
- Rauhafer führt vor allem in engen Getreidefruchtfolgen zu einer erhöhten Virusbelastung.
- Gräser fördern in Zuckerrüben den Befall mit *Rhizoctonia solani*.

Übersicht der TopQuh-Zwischenfruchtmischungen mit Einstufung der Fruchtfolgeeignung:

Mischung	Zusammensetzung (Gewichts-%)	Saattermin	Saatstärke (kg/ha)	Fruchtfolgeeignung				
				Getreide	Mais	Raps	Zucker- rübe	Kartoffel
<b>Quh 1</b>	40 % Gelbsenf 60 % Ölrettich	Anf./Mitte August – Ende September	16-20	x	x	-	(x)	(x)
<b>Quh 2</b>	65 % Gelbsenf 15 % Öllrein 20 % Alexandrinerklee	Mitte Juli – Ende August	18-23	x	x	-	(x)	-
<b>Quh 3</b>	35 % Gelbsenf 30 % Ölrettich 35 % Buchweizen	Anf./Mitte August – Ende September	20-25	x	x	-	-	-
<b>Quh 4</b>	65 % Alexandrinerklee 35 % Phacelia	Mitte Juli – Ende August	10-14	x	x	x	x	-
<b>Quh 5</b>	25 % Öllein 30 % Rauhafer 20 % Alexandrinerklee 25 % Phacelia	Ende Juli – Ende August	18-20	x	x	x	-	-
<b>Quh 6</b>	65 % Welsches Weidelgras 30 % Alexandrinerklee 5 % Phacelia	Mitte Juli – Mitte September	25-30	x	x	-	-	-
<b>Quh 7</b>	17,5 % Gelbsenf 15 % Ölrettich 25 % Buchweizen 15 % Alexandrinerklee 10 % Phacelia 5 % Serradella 7,5 % Sonnenblumen 5 % Leindotter	Mitte Juli – Ende August	18-23	x	x	-	-	-
<b>Quh 8</b>	80 % Gelbsenf 20 % Leindotter	Mitte August – Ende September	13-15	x	x	-	-	-

(x) eingeschränkte Eignung: Zur Nematodenbekämpfung resistente Sorten verwenden! Spezielle Mischungen auf Anfrage erhältlich.

**Hinweis:** Unsere TopQuh Bienenweide erfüllt die Anforderungen der „Honigbrache“.