



Pflanzenbau Aktuell Nr. 27/2020 – 15.07.2020 Stoppelbehandlung

Nutzen Sie die Möglichkeit der Stoppelbehandlung um auch Wurzelunkräuter und -ungräser zu bekämpfen. Vor allem gegen **Acker- und Zaunwinde, Ackerkratzdistel, Landwasserknöterich, Schachtelhalm und Quecke** ist die Bekämpfungsleistung der zugelassenen Herbizide im Ackerbau stark eingeschränkt, da in den meisten Fällen nur eine unterdrückende Wirkung erreicht wird.

Ist ein **schneller Umbruch** entscheidend, haben sich in den letzten Jahren vor allem **Roundup-Produkte** als äußerst zuverlässig erwiesen. Beim Einsatz gegen einjährige Unkräuter kann bereits nach 6 Stunden eine Bodenbearbeitung erfolgen. Gegen Quecken sollte ein Zeitfenster von zwei Tagen für eine sichere Wirkung zur Verfügung stehen.

Produktauswahl von Totalherbiziden in Ackerbaukulturen:

Produkt	Wirkstoffgehalt (g/kg bzw. g/l)	Aufwandmenge kg/ha bzw. l/ha			Anwendungsbestimmungen		
		Getreide- u. Rapsstoppel	Ackerbaukulturen VA – 2 T. v. d. Saat	Ackerbaukulturen VA – 5 T. n. d. Saat (ausgen. Raps)	Hangneigung > 2 % (m)	Gewässerabstand (m)	weitere Auflagen
Roundup Rekord	720	2,5	2,5	2,5	10	*	NT103
Roundup PowerFlex	480	3,75	3,75	3,75	10	*	NT103
Durano TF	360	5,0	-	-	-	*	NT101

* länderspez. Gewässerabstand beachten

Empfehlung für eine nachhaltige Winden-Bekämpfung auf Getreide-/Rapsstoppeln:

Unkräuter/Ungräser	Produkt	Aufwandmenge (l/ha)	Gewässerabstand (m) (0, 50, 75, 90 %)	weitere Auflagen
Zaunwinde	Pyrat XL	1,5-1,8	10, 5, 5, *	NT 102
Zaun- und Ackerwinde, Ampfer- und Distel-Arten, Quecke, Ackerschachtelhalm, Durchwuchskartoffeln	Pyrat XL + Durano TF	1,0 + 5,0	10, 5, 5, *	NT 101 NT 102
Acker-Winde, Ampfer- und Distel-Arten, Quecke, Ackerschachtelhalm, Landwasserknöterich, Durchwuchskartoffeln	Kyleo ¹⁾	5,0	5, 5, *, *	NT 109, NG 405

* länderspez. Gewässerabstand beachten ¹⁾ Hangneigungsaufgabe: 20 m

Hinweis: Bei der Anwendung von **Kyleo** sind folgende **Wartezeiten** einzuhalten:

- 3 Tage vor Getreide
- 7 Tage vor Gräsern und Sorghum
- 14 Tage vor Zwischenfrüchten
- 28 Tage vor Raps

Bei der Anwendung von **Pyrat XL** ist eine Einwirkzeit von 5 – 6 Wochen für eine ausreichende Wirkung nötig!