



## Pflanzenbau Aktuell Nr. 29/2020 – 18.08.2020 Herbizideinsatz in Winterraps

### Vorauslauf – Clomazone-haltig

Anwendung bis max. 3 T. n. d. Saat  
**Clomazone-Auflagen beachten!**  
\* NT154 bei Solo-Anwendung (s. Anhang)

**Runway VA +  
Gamit 36 AMT\***  
0,2 + 0,3 l/ha

Breite Mischverunkrautung inkl.  
**Wegrauke und Kornblume**  
→ keine Hangneigungsaufgabe

**Colzor Trio**  
3,0-4,0 l/ha

Breite Mischverunkrautung inkl.  
**Storchschnabel und Windhalm**



### Vorauslauf – Clomazone-frei, Metazachlor-haltig

Breite Mischverunkrautung inkl.  
**Ungräser**

**Fuego Top<sup>1)</sup> 2,0 l/ha**

**Nachlage** bei Bedarf gegen  
Kamille, Kornblume, ... z.B.  
in Verbindung mit  
Graminizideinsatz


Breite Mischverunkrautung inkl.  
**Storchschnabel und Ungräser**

**Butisan Gold<sup>1)</sup> 2,5 l/ha**

**Runway 0,2 l/ha**


**Fuego  
Top<sup>1)</sup>  
+ Runway  
VA**  
1,5 + 0,2  
l/ha

Breite Mischverunkrautung inkl.  
**Kornblume, Klatschmohn und  
Ungräser**



1) NG301-1: Kein Einsatz in Wasserschutzgebieten oder im Einzugsgebiet von Trinkwassergewinnungsanlagen  
NG346: Innerhalb von 3 Jahren max. 1.000 g Metazachlor/ha auf derselben Fläche

## Früher Nachauflauf



## Nachauflauf – Belkar (vorwiegend blattaktiv)

Anwendung ab **BBCH 12**  
Abstand zwischen Anwendungen mind. 14 Tage  
**Mischungsinformationen:**

- Mischbar mit
  - allen Insektiziden
  - reinem Bor-Dünger
  - Gallant, Focus Ultra, Panarex
- Nicht mischbar mit Carax, Caramba und Efilor
- Spritzabstand von 7 Tagen:
  - Graminizide, z.B. Fusilade Max, Agil-S, ...
  - Clomazone- und/oder Metazachlor-haltige Herbizide
  - Spurennährstoffdünger
  - Toprex, Tilmor, Folicur
  - Fox

