

Pflanzenbau Aktuell Nr. 3/2022 – 15.03.2022

Herbizideinsatz in Futtererbsen, Ackerbohnen und Lupinen

Die Aussaat der Körnerleguminosen ist in weiten Teilen abgeschlossen, sodass der Herbizideinsatz in Ackerbohne, Futtererbse und Lupine erfolgen kann. Die Auswahl der Herbizide ist in diesen Kulturen sehr eingeschränkt und beschränkt sich in der Regel auf den Einsatz von Voraufbauherbiziden.

Um eine optimale Wirkung zu erzielen, sind ein feinkrümeliges und gut abgesetztes Saatbett, sowie feuchte Bodenbedingungen von Vorteil. Dies wird beispielsweise durch einen Walzengang nach der Saat und dem Herbizideinsatz in den Morgenstunden auf ein taufeuchtes Saatbett erreicht.

Um ein breites Unkrautspektrum zu erfassen haben sich Produktkombinationen wie z.B. **Bandur 2,5 l/ha + Boxer 2,5 l/ha** oder **Boxer 3,0 l/ha + Stomp Aqua 2,0 l/ha** bewährt. Beachten Sie, dass die Genehmigung für die Indikation von **Gardo Gold** in **Lupine** widerrufen wurde und somit eine **Anwendung nicht mehr zulässig** ist.

Diese Übersicht zeigt die zugelassenen Herbizide in den jeweiligen Kulturen.

Herbizid	Wirkstoff	Wirkstoffgehalt (g/kg bzw. l)	zugel. Anwendungszeitraum (BBCH)	max. zugel. Aufwandmenge (l bzw. kg/ha)	Ackerfuchsschwanz	Jährige Rispe	Hirse-Arten	Ackerhellerkraut	Ackerhohlzahn	Amarant	Ausfallraps	Ehrenpreis	Franzosenkraut	Gänsefuß, Melde	Kamille	Klettenlabkraut	Schwarzer Nachtschatten	Stiefmütterchen	Taubnessel	Windknöterich	Ackerbohne	Futtererbse	Lupine
Einzelprodukte																							
Bandur	Aclonifen	600	00-08	4,0	xx(x)	xxx	xxx	xxx	(x)	xx(x)	xx(x)	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xx(x)	-	x(x)	xxx	x(x)	✓	✓	-
Boxer	Prosulfocarb	800	VA	5,0	x(x)	xxx	-	xxx	xxx	x(x)	xx	xxx	xx(x)	x(x)	(x)	xx(x)	xx	-	xx(x)	x(x)	✓	✓	✓
Centium 36 CS	Clomazone	360	00-09	0,25	-	-	-	xx	(x)	-	x(x)	xx	-	(x)	-	xx(x)	(x)	(x)	xxx	x(x)	✓	✓	-
Novitron DamTec	Clomazone + Aclonifen	30 + 500	VA	2,4	x(x)	xxx	xx(x)	xxx	x(x)	xx(x)	xx(x)	xxx	xx(x)	xxx	xx(x)	xx(x)	(x)	xx	xxx	x(x)	✓	✓	-
Spectrum Plus	Pendimethalin + Dimethenamid-P	250 + 212,5	VA & 10-33 ¹⁾	4,0	x(x)	xxx	xx(x)	xx	xx	xxx	x(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	x(x)	xx(x)	xx	xxx	x(x)	✓	✓	✓
Mischungen																							
Boxer + Stomp Aqua	Prosulfocarb + Pendimethalin	800 + 455	VA	3,0 + 2,0	x	xxx	x	xxx	xxx	xx	x(x)	xxx	xx	xx	x	xxx	x(x)	x(x)	xxx	x(x)	✓	✓	✓

¹⁾ Anwendung im NA nur in Futtererbse zulässig

Der Gräserbekämpfung kommt Fruchtfolge-übergreifend eine immer größere Bedeutung zu. Der optimale Einsatztermin für Graminizide ist im **2 bis 4-Blatt-Stadium** der Ungräser.

In Ackerbohnen und Erbsen bietet sich der Einsatz von **0,75 l/ha Zertrola/Agil-S** oder **1,25 l/ha + 1,25 l/ha Focus Ultra + Dash** an. In Lupinen können **0,5 l/ha + 1,0 l/ha Select + Radiamix** eingesetzt werden.