



Pflanzenbau Aktuell Nr. 7/2022 – 08.04.2022 Herbizideinsatz in Kartoffeln

Die Unkrautbekämpfung genießt in der Kartoffel höchste Wichtigkeit. Die Voraufmaßnahme bis eine Woche vor kvD gehört immer noch zum Standard, da diese in Sachen **Wirkungssicherheit** und **Kulturverträglichkeit** die sicherste Maßnahme darstellt. Beste Wirkungsleistungen werden bei einer Herbizidapplikation auf **gut abgesetzte, feuchte Dämme** erreicht. Durch den Zusatz von **0,3-0,4 + 0,75-1,0 l/ha Quickdown + Toil** werden bereits aufgelaufene Unkräuter sicher erfasst.

Empfohlene Produktkombinationen für die Voraufmaßung in Kartoffel

Herbizid-kombinationen	Aufwandmenge (l bzw. kg/ha)	Anwendungs- zeitraum	Wirkung auf											
			Ackerfuchs- schwanz	Flughazer	Hühnerhirse	Amarant	Bingelkraut	Franzosen- kraut	Gänsefuß, Melde	Kamille	Klettenlabkraut	Schwarzer Nachtschatten	Winden- knöterich	Knöterich- Arten
Metribuzin-frei														
Bandur + Proman	2,5 + 2,5	VA	xxx	x(x)	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	x(x)	xx	xx(x)
Boxer + Bandur	2,5 + 2,5	VA	xxx	x(x)	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	xxx	xx(x)	xxx	xx	xx	xx
Boxer + Proman	3,0 + 2,0	VA	x(x)	x(x)	xx	xx	x	xxx	xx(x)	xx	xx(x)	xx(x)	xx	xx
Novitron DamTec + Proman	2,0 + 2,0	VA	x(x)	x(x)	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	xx	xxx
Proman Centium 36 CS	2,0-2,5 + 0,25	VA	(x)	-	xx(x)	xx(x)	xx	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	xx	xx	xxx
Metribuzin-haltig														
Arcade¹⁾	4,0-5,0	VA & NA ²⁾	xx(x)	x(x)	xx	x(x)	x(x)	xxx	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx	xx	xx
Bandur + Artist³⁾	2,0 + 2,0	VA	xxx	x(x)	xx(x)	xx	xx	xx(x)	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	xx	xx
Boxer + Sencor Liquid	4,0 + 0,5	VA- kvD	xx	x(x)	xx	x(x)	xx	xxx	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx	xx
Novitron DamTec + Sencor Liquid	2,0 + 0,4	VA	xx(x)	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	x(x)	xx
Proman + Metric	2,0 + 1,0	VA	xx	-	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	xx	xx(x)

¹⁾ Drainauflage NG405 beachten!

²⁾ Anwendungsempfehlung NA: 2,0 l/ha

³⁾ Hohe Ansprüche an die Bodenfeuchtigkeit

Hinweis: Auf **trockenen** oder **humosen Böden** kann es zur Festlegung bodenaktiver Wirkstoffe kommen. Bei dadurch benötigten Nachaufmaßungen besteht die Möglichkeit von Phytotox.

Die **Bekämpfung von Ungräsern** erfolgt im 3- bis 4-Blatt-Stadium der Gräser (NA Kultur). Es empfehlen sich beispielsweise **1,0 l/ha Fusilade Max** (Quecke 2,0 l/ha) oder **1,0 l/ha Agil S** (Quecke 1,5 l/ha).